

Acta Bot. Croat. 29 (1970) 255—256

NOVO NALAZIŠTE VRSTE *TULIPA*
PRAECOX TEN. U HRVATSKOJ

Mit deutscher Zusammenfassung

SALA UNGAR i LJERKA REGULA-BEVILACQUA

(Iz Instituta za botaniku Sveučilišta u Zagrebu)

Tulipa praecox Ten. bila je dosad poznata u Hrvatskoj jedino iz okolice Bakra, gdje ju je zabilježio i sabrao Hirc (1884), i to njezin varijetet *hexagonata* Borb., koji se od tipične vrste razlikuje po tome što su joj unutarnji listići ocvijeća na vrhu tupo zaobljeni.

Novo nalazište tipične vrste *Tulipa praecox* Ten. u Hrvatskoj jest istočni dio otoka Korčule — područje Donjeg blata, između grada Korčule i Lumbarde.

U jednom starom vinogradu ta je vrsta tulipana na površini od cca 2.500 m² vrlo obilno nazočna, tako obilno da se na 1 m² nalazi više od 100 biljaka. U drugoj polovini mjeseca ožujka tulipani su u punom cvatu.

Prema Aschersonu i Graebneru (1905—1907) *Tulipa praecox* Ten. poznata je iz južne Francuske, Italije, Balkanskog poluotoka, Male Azije, Sirije i Palestine. Hayek (1933) je navodi kao samoniklu vrstu jedino za srednju Italiju (isto i Fiori 1923-1925), dok za Hrvatsku i Grčku kaže: subsontanea. Međutim prema navodima Hegija (1939) taj je tulipan samonikao jedino na Orijentu odakle je u 18. stoljeću prenesen u Evropu: i to u Italiju i južnu Francusku gdje se je mjestimice udomaćio. Po tome bi i biljka na Korčuli, a jednako i biljka u okolici Bakra bile također udomaćene a ne samonikle.

Kako su nalazišta u Evropi razmjerno ograničena, smatramo nalaz vrste *Tulipa praecox* na otoku Korčuli u svakom slučaju zanimljivim.*

* »Priroda« br. 7 (1967) donosi članak I. Onofrija u kojem opisuje vrstu *Tulipa baetica* Boiss. et Heldr. iz Korčule vjerojatno s istog nalazišta. No nedvojbeno se tu radi o vrsti *Tulipa praecox* Ten.

Literatura — Schrifttum

- Ascherson, P. — Graebner, P., 1905—1907: Synopsis der Mitteleuropäischen Flora. III, Leipzig.
- Fiori, A., 1923—1925: Nuova flora analitica d'Italia. I. Firenze.
- Hayek, A., 1932—1933: Prodrömus florae peninsulae Balcanicae. III. Berlin-Dahlem.
- Hegi, G., 1939: Illustrierte Flora von Mitteleuropa II.
- Hirc, D., 1884: Flora okolice bakarske, Rad Jugosl. akad. 69.

ZUSAMMENFASSUNG

EIN NEUER FUNDORT VON *TULIPA PRAECOX* TEN. IN KROATIEN

Sala Ungar und Ljerka Regula-Bevilacqua

(Aus dem Botanischen Institut der Universität Zagreb)

Die Autoren fanden in einem alten Weingarten auf der Insel Korčula die wilde *Tulipa praecox* Ten. Bemerkenswert ist, dass diese Tulpe dort in grossen Mengen auf einer Fläche von cca 2.500 m² vorkommt. Wenn die Annahme Hegis, dass *Tulipa praecox* Ten. nur im Orient autochton ist, woher sie in 18 Jahrhundert nach Südfrankreich und Italien gebracht wurde, richtig ist dann wäre der Fundort auf der Insel Korčula auch subspontan.

Dr Sala Ungar
Botanički vrt
Marulićev trg 9a
Zagreb (Jugoslavija)

Ljerka Regula-Bevilacqua, mr biol.
Botanički vrt
Marulićev trg 9a
Zagreb (Jugoslavija)